

Analgesia epidural

Que es la analgesia epidural?

La analgesia epidural es una forma de calmar el dolor luego de la cirugía. La medicación es suministrada a través de un tubo fino llamado catéter que es puesto en la piel del niño cerca de la columna vertebral. El catéter es colocado por el anestesista antes de la cirugía cuando su niño está sedado o dormido. El catéter es introducido en el espacio epidural, un pequeño espacio alrededor de la médula espinal, y luego es sujetado en su lugar por una gasa transparente. Después de la cirugía, el catéter será utilizado para dar medicación para el dolor.

Como funciona?

La medicación bloquea el mensaje de dolor que envían los nervios al cerebro. La medicación es dada a lo largo del día por una bomba que provee un control seguro del dolor para su niño. También, algunos niños tienen ACP epidural (analgesia controlada por el paciente). El ACP permite a su niño tomar más medicina cuando él la necesite pulsando un botón especial en la bomba. La bomba es programada para prevenir un exceso de medicación. Por favor, note que no podemos sacar por completo el desonfort en su niño. Él será controlado de cerca por cirujanos, anestesistas, y enfermeras para asegurar que su niño esté lo más cómodo que sea posible durante su recuperación.

Duele recibir medicación por el catéter epidural?

NO! La mayoría de los niños no pueden sentir el catéter o la medicación en absoluto. Su niño se sentirá adormecido o pesado en las piernas, pero él continuará moviendo sus piernas.

Cuales son los efectos secundarios?

Los efectos secundarios son posibles cuando es dada cualquier medicación. Dado que se utiliza el catéter epidural en vez de la vía intra venosa, los efectos secundarios generalmente son limitados. Los efectos secundarios más comunes son picazón, náuseas, y vómitos. Estos generalmente son leves y se usan otras medicinas para tratar estos problemas. Otros efectos secundarios son hormigueo en las piernas, dificultad para orinar, adormecimiento, y respiración más lenta de lo habitual. Las enfermeras controlarán frecuentemente la temperatura, la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca y respiratoria. Tal vez una sonda colectora de orina sea utilizada mientras el catéter epidural está colocado.

Otros posibles efectos secundarios tienen relación con el catéter más que con la medicación. Estos son infecciones, sangrado, dolor de cabeza, pero estos ocurren muy raramente.

Cuanto tiempo se necesita el catéter puesto?

El catéter es usualmente dejado entre 2 a 5 días, dependiendo del tipo de cirugía y cómo se recupera su niño. Será removido por un anestesista cuando no se necesite más. Su niño sentirá que le sacan la cinta adhesiva, pero el catéter no se siente cuando es retirado. Luego de que se retira el catéter se suministra medicación vía oral o intravenosa para que su niño continúe cómodo y sin dolor.